

Пам'ятка для пацієнта

Еліквіс

(апіксабан)

Завжди тримайте цю

пам'ятку при собі

Покажіть цю пам'ятку своєму фармацевту, стоматологу та будь-якому іншому медичному працівнику, який вас лікує

Інформація для пацієнтів

- Приймайте Еліквіс регулярно, як зазначено в інструкції. Якщо Ви пропустили прийом, прийміть препарат, як тільки згадаєте, і продовжуйте прийом відповідно до свого режиму.
- Не припиняйте прийом препарату Еліквіс, не повідомивши про це лікарю, оскільки існує ризик розвитку інсульту або іншого ускладнення.
- Еліквіс допомагає розріджувати кров. Однак це може підвищувати ризик кровотечі.
- Ознаки та симптоми кровотечі включають синці або підшкірні кровотечі, дьогтьоподібний колір калу, кров у сечі, кровотечу з носу, запаморочення, втому, блідість або слабкість, раптовий сильний головний біль, кашель або блювоту з кров'ю.
- Якщо кровотеча не зупиняється самостійно, **негайно зверніться за медичною допомогою.**
- Якщо Вам потрібна операція чи будь-яка інвазивна процедура, повідомте лікарю про те, що Ви приймаєте Еліквіс.

**Я приймаю антикоагулянтний препарат
Еліквіс (апіксабан)
для профілактики тромбозу**

*Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу.
Пацієнтам та медичним працівникам пропонується повідомляти про будь-
які підозрювані побічні реакції через державну систему звітування.*

Інформація для медичних працівників

- Еліквіс (апіксабан) – це антикоагулянт для перорального застосування, механізмом дії якого є пряме селективне інгібування фактору Ха.
- Еліквіс може збільшувати ризик кровотечі. У випадку значної кровотечі, прийом слід негайно припинити.
- Лікування препаратом Еліквіс не вимагає рутинного моніторингу лабораторних показників під час прийому. Кількісне визначення активності пригнічення фактора Ха може бути корисним у виняткових випадках, наприклад, при передозуванні та невідкладному хірургічному втручанні (тести згортання крові, такі як протромбіновий час (ПЧ), міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС) та активований частковий тромбoplastиновий час (АЧТЧ) не рекомендуються) – див. Інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.
- Існує лікарський засіб для нейтралізації активності інгібітора фактора Ха.

Будь ласка, заповніть цей розділ або попросіть свого лікаря зробити це

Ім'я _____
Дата народження _____
Показання _____
Доза _____ мг два рази на добу
Ім'я лікаря _____
Номер телефону лікаря _____

За додатковою інформацією звертайтеся у Представництво “Пфайзер Експорт Бі. Ві.” в Україні: 03038, м. Київ, вул. Амосова, 12. Тел. (044) 391-60-50.

Просимо повідомляти про будь-які підозрювані небажані реакції через державну систему звітування:

ДП Державний Експертний Центр МОЗ України, (044) 202-17-00. Електронна форма карти-повідомлення знаходиться за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>